



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU  
POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE  
**ELEKTROTEHNIČKI ODJEL**

## RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNUJU 2012. – VIŠA RAZINA

### I. ZADATCI VIŠESTRUKOGA IZBORA

1. D. Zadatak rješavamo koristeći kalkulator. Izračunajmo zasebno vrijednost svakoga izraza:

$$\log_2 9 = \frac{\log 9}{\log 2} = \frac{0.95424250943932487459005580651023}{0.30102999566398119521373889472449} \approx 3.169925 \quad (\text{ovdje smo primjenili identitet } \log_a b = \frac{\log b}{\log a}, \text{ a mogli smo primijeniti i identitet } \log_a b = \frac{\ln b}{\ln a} \text{ s istim rezultatom});$$

$$\sin(47^\circ 15') = \sin\left(47^\circ + \frac{15}{60}^\circ\right) = \sin\left(47^\circ + \frac{1}{4}^\circ\right) = \sin(47^\circ + 0.25^\circ) = \sin 47.25^\circ \approx 0.73432251;$$
$$\left| \frac{5}{3} : \frac{1}{2} - 5 \right| = \left| \frac{5}{3} \cdot \frac{2}{1} - 5 \right| = \left| \frac{10}{3} - 5 \right| = \left| \frac{10 - 15}{3} \right| = \left| -\frac{5}{3} \right| = \frac{5}{3} = 1.6 \approx 1.6666667;$$
$$2 \cdot 10^{0.34} \approx 2 \cdot 2.1877616239495525622261149163842 \approx 4.3755232478991.$$

Tako vidimo da su prve tri jednakosti točne, a četvrta pogrešna.

2. D. Iz zadane jednakosti uzimanjem drugoga korijena dobijemo:

$$|a| \leq \sqrt{8} = \sqrt{4 \cdot 2} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{2} = 2 \cdot \sqrt{2} \approx 2.82842712474619.$$

Budući da  $a$  mora biti cijeli broj, zapravo tražimo ukupan broj svih cijelih brojeva  $a$  takvih da vrijedi nejednakost

$$|a| \leq 2,$$

odnosno

$$-2 \leq a \leq 2.$$

Pet je cijelih brojeva koji zadovoljavaju posljednju nejednakost. To su  $-2, -1, 0, 1$  i  $2$ .

3. C. Riješimo zadanu jednadžbu koristeći formulu za kvadrat zbroja i uobičajena pravila za rješavanje jednadžbe. Imamo redom:

$$(2 \cdot x)^2 - 2 \cdot 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2 - (x^2 + 3 \cdot x - 2 \cdot x - 6) = 2 - (x - 3 \cdot x^2),$$
$$4 \cdot x^2 - 20 \cdot x + 25 - x^2 - 3 \cdot x + 2 \cdot x + 6 = 2 - x + 3 \cdot x^2,$$
$$4 \cdot x^2 - 20 \cdot x + 25 - x^2 - 3 \cdot x + 2 \cdot x + 6 - 2 + x - 3 \cdot x^2 = 0,$$
$$-20 \cdot x + 29 = 0$$
$$-20 \cdot x = -29.$$

Odatle dijeljenjem s  $(-20)$  dobivamo  $x = \frac{29}{20}$  i to je jedino rješenje polazne jednadžbe.



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE

## ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

### RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNUJU 2012. – VIŠA RAZINA

4. **B.** Oplošje tetraedra jednako je zbroju površina četiriju sukladnih jednakostraničnih trokutova koji tvore osnovku i plašt tetraedra. Površina jednoga od tih trokutova je  $P = \frac{a^2 \cdot \sqrt{3}}{4}$  kv.jed. , pri čemu je  $a$  duljina osnovnoga brida tetraedra. Zbog toga je oplošje tetraedra

$$O = 4 \cdot P = 4 \cdot \frac{a^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = a^2 \cdot \sqrt{3} \text{ kv. jed.}$$

Preostaje nam u navedeni izraz uvrstiti  $a = 3$  cm, pa odmah slijedi  $O = 3^2 \cdot \sqrt{3} = 9 \cdot \sqrt{3} \text{ cm}^2$ .

5. **B.** Iz podatka da je brzina omjer prijeđenoga puta i vremena slijedi da je prijeđeni put jednak umnošku brzine i vremena. Pretpostavimo da jedna godina ima ukupno 365 dana, pa zaključujemo da je:

$$4.3 \text{ godine} = 4.3 \cdot 365 \text{ dana} = 4.3 \cdot 365 \cdot 24 \text{ sata} = 4.3 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 60 \text{ minuta} = 4.3 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60 \text{ sekundi} = 135\,604\,800 \text{ sekundi} \approx 1.356 \cdot 10^8 \text{ sekundi.}$$

Iz podatka da svjetlost prijeđe 300 milijuna metara u sekundi zaključujemo da svjetlost prijeđe 300 000 kilometara u sekundi (tj. 1000 puta manje kilometara nego metara). Zbog toga je tražena udaljenost (iskazana u kilometrima) približno jednaka:

$$s = 300\,000 \text{ kilometara/sekunda} \cdot 1.356 \cdot 10^8 \text{ sekunda} = 3 \cdot 10^5 \text{ km/s} \cdot 1.356 \cdot 10^8 \text{ s} \approx 4.1 \cdot 10^{13} \text{ km,}$$

odnosno, ako koeficijent uz potenciju zaokružimo na njemu najbliži prirodan broj,  $s \approx 4 \cdot 10^{13} \text{ km}$ .

6. **B.** Točku u kojoj graf zadane funkcije siječe os  $x$  dobit ćemo tako da riješimo jednadžbu  $f(x) = 0$  po nepoznanici  $x$ , a točku u kojoj graf zadane funkcije siječe os  $y$  dobit ćemo tako da u propis zadane funkcije uvrstimo  $x = 0$ . Krenimo redom:

$$\begin{aligned} f(x) &= 0, \\ \log_2(x+2) + 1 &= 0, \\ \log_2(x+2) &= -1, \\ x+2 &= 2^{-1}, \\ x &= 2^{-1} - 2 = \frac{1-2 \cdot 2}{2} = \frac{1-4}{2} = -\frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Dakle, graf zadane funkcije siječe os  $x$  u točki  $S_1\left(-\frac{3}{2}, 0\right)$ . Odredimo sjecište s osi  $y$ :

$$f(0) = \log_2(0+2) + 1 = \log_2 2 + 1 = 1 + 1 = 2.$$

(Primijenili smo identitet  $\log_a a = 1$ , za svaki  $a > 0$ .) Zbog toga graf zadane funkcije siječe os  $y$  u točki  $S_2(0, 2)$ . Prema tome, tražena sjecišta su  $S_1\left(-\frac{3}{2}, 0\right)$  i  $S_2(0, 2)$ .



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU  
POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE  
**ELEKTROTEHNIČKI ODJEL**

## RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNUJU 2012. – VIŠA RAZINA

7. **D.** Označimo s  $C$  ortogonalnu projekciju točke  $B$  na ravninu. Trokut  $ABC$  je pravokutan s pravim kutom u točki  $C$ . Znamo dva njegova elementa:  $c = |AB| = 12 \text{ cm}$  i

$$\alpha = \angle BAC = 32^\circ 12' = 32^\circ + \frac{12}{60}^\circ = 32^\circ + \frac{1}{5}^\circ = 32^\circ + 0.2^\circ = 32.2^\circ.$$

Tražena duljina ortogonalne projekcije dužine  $AB$  jednaka je duljini katete  $b = |\overline{AC}|$  uočenoga trokuta. Izračunat ćemo je pomoću jednakosti

$$\cos \alpha = \frac{b}{c} .$$

Iz te jednakosti odmah slijedi:

$$b = |\overline{AC}| = c \cdot \cos \alpha = 12 \cdot \cos(32.2^\circ) = 12 \cdot 0.846193 \approx 10.154318 \approx 10.15 \text{ cm.}$$

8. **A.** Neka su  $a$  i  $b$  duljine stranica polaznoga pravokutnika. Njegova je površina

$$P = a \cdot b \text{ kv. jed.}$$

Poveća li se duljina polaznoga pravokutnika za 10%, nova duljina pravokutnika bit će

$$a' = a + \frac{10}{100} \cdot a = a \cdot \left(1 + \frac{10}{100}\right) = a \cdot (1 + 0.1) = 1.1 \cdot a .$$

Smanji li se širina polaznoga pravokutnika za 15%, nova širina pravokutnika bit će

$$b' = b - \frac{15}{100} \cdot b = b \cdot \left(1 - \frac{15}{100}\right) = b \cdot (1 - 0.15) = 0.85 \cdot b .$$

Površina pravokutnika čije stranice imaju duljine  $a'$  i  $b'$  jednaka je:

$$P' = a' \cdot b' = (1.1 \cdot a) \cdot (0.85 \cdot b) = (1.1 \cdot 0.85) \cdot a \cdot b = 0.935 \cdot (a \cdot b) = 0.935 \cdot P \text{ kv. jed.}$$

Zbog toga zaključujemo da se površina polaznoga pravokutnika smanjila za

$$\Delta P = P - P' = P - 0.935 \cdot P = (1 - 0.935) \cdot P = 0.065 \cdot P = \frac{0.065 \cdot 100}{100} \cdot P = \frac{6.5}{100} \cdot P = 6.5\% \cdot P$$

ili, kraće i nepreciznije, za 6.5%.

9. **A.** Dužina  $\overline{BC}$  je tetiva trokutu opisane kružnice. Jedan njezin obodni kut je kut prvi vrhu  $A$ , točnije,  $\angle BAC = 46^\circ$ . No, i kut  $\angle BDC$  je također obodni kut nad tom tetivom. Budući da su obodni kutovi nad istom tetivom međusobno sukladni, slijedi  $\angle BDC = \angle BAC = 46^\circ$ . Nadalje,



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU  
POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE  
**ELEKTROTEHNIČKI ODJEL**

## RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNUJU 2012. – VIŠA RAZINA

pravac  $CD$  je simetrala kuta u vrhu  $C$ , što znači da je  $\angle BCD = \frac{1}{2} \cdot 60^\circ = 30^\circ$ . Tako konačno dobivamo:

$$\angle CBD = 180^\circ - (\angle BCD + \angle CDB) = 180^\circ - (30^\circ + 46^\circ) = 180^\circ - 76^\circ = 104^\circ.$$

- 10. B.** Prema podatcima iz zadatka, težina astronauta obrnuto je razmjerna kvadratu njegove udaljenosti od središta Zemlje. To znači da vrijedi jednakost

$$T = \frac{k}{d^2},$$

pri čemu je  $T$  težina astronauta, a  $d$  njegova udaljenost od središta Zemlje. Iz te jednakosti slijedi

$$k = T \cdot d^2.$$

Primjenom navedene jednakosti na slučajeve kad je astronaut težak  $T_1 = 874$  N udaljen od površine Zemlje za  $d_1 = 6\ 400$  km i kad je astronaut težak  $T_2 = 74$  N udaljen od površine Zemlje za  $d_2$  km dobivamo:

$$T_1 \cdot d_1^2 = T_2 \cdot d_2^2.$$

Odavde lagano slijedi

$$d_2 = \sqrt{\frac{T_1 \cdot d_1^2}{T_2}} = \sqrt{\frac{T_1}{T_2} \cdot d_1},$$

pa uvrštavanjem podataka  $T_1 = 824$ ,  $T_2 = 74$  i  $d_1 = 6\ 400$  dobivamo:

$$d_2 = \sqrt{\frac{824}{74}} \cdot 6400 \approx 21\ 356.38394 \approx 21\ 356 \text{ km.}$$

Tražena udaljenost astronauta od površine Zemlje je za  $6\ 400$  km manja i iznosi približno

$$d' = d_2 - 6\ 400 = 14\ 956 \text{ km.}$$

- 11. A.** Primijenit ćemo sljedeće identitete:

$$\begin{aligned}x^3 + 8 &= x^3 + 2^3 = (x + 2) \cdot (x^2 - 2 \cdot x + 4), \\x^4 - 16 &= (x^2)^2 - 4^2 = (x^2 - 4) \cdot (x^2 + 4) = (x^2 - 4^2) \cdot (x^2 + 4) = (x - 2) \cdot (x + 2) \cdot (x^2 + 4); \\x^3 - 2 \cdot x^2 + 4 \cdot x - 8 &= x^2 \cdot (x - 2) + 4 \cdot (x - 2) = (x - 2) \cdot (x^2 + 4).\end{aligned}$$

Tako je baza potencije jednaka:



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE

## ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

### RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNUJU 2012. – VIŠA RAZINA

$$\begin{aligned} \frac{(x+2) \cdot (x^2 - 2 \cdot x + 4)}{(x-2) \cdot (x+2) \cdot (x^2 + 4)} + \frac{2 \cdot x}{(x-2) \cdot (x^2 + 4)} &= \frac{x^2 - 2 \cdot x + 4}{(x-2) \cdot (x^2 + 4)} + \frac{2 \cdot x}{(x-2) \cdot (x^2 + 4)} = \\ &= \frac{x^2 - 2 \cdot x + 4 + 2 \cdot x}{(x-2) \cdot (x^2 + 4)} = \frac{x^2 + 4}{(x-2) \cdot (x^2 + 4)} = \frac{1}{x-2} \end{aligned}$$

Zbog toga je polazni izraz jednak

$$\left( \frac{1}{x-2} \right)^{-2} = [(x-2)^{-1}]^{-2} = (x-2)^2 .$$

**12. B.** Riješimo zasebno svaku nejednadžbu. Imamo redom:

**I.**  $\frac{2 \cdot x - 1}{x + 2} < 1 \Leftrightarrow \frac{2 \cdot x - 1}{x + 2} - 1 < 0 \Leftrightarrow \frac{2 \cdot x - 1 - (x + 2)}{x + 2} < 0 \Leftrightarrow \frac{2 \cdot x - 1 - x - 2}{x + 2} < 0 \Leftrightarrow \frac{x - 3}{x + 2} < 0$ . Tako imamo ukupno dvije mogućnosti:

- a)  $x - 3 < 0$  i  $x + 2 > 0$ , otkuda je  $x < 3$  i  $x > -2$ , što daje interval  $(-2, 3)$ ;
- b)  $x - 3 > 0$  i  $x + 2 < 0$ , otkuda je  $x > 3$  i  $x < -2$ , što je nemoguće.

Dakle, rješenje prve nejednadžbe je interval  $(-2, 3)$ .

**II.** Iz  $3 \cdot x + 3 < 0$  slijedi  $3 \cdot x < -3$ , odnosno dijeljenjem s 3 (pri čemu se znak nejednakosti ne mijenja)  $x < -1$ . Zbog toga je rješenje druge nejednadžbe interval  $(-\infty, -1)$ .

Tako je skup svih rješenja zadatoga sustava nejednadžbi jednak  $(-2, 3) \cap (-\infty, -1) = (-2, -1)$ .

**13. C.** Iz zadane slike razabiremo da graf polazne linearne funkcije prolazi točkom  $(0, 1)$ , što znači da je  $f(0) = 1$ . Zbog toga za funkciju  $f_1 = \frac{1}{f}$  vrijedi  $f_1(0) = \frac{1}{f(0)} = \frac{1}{1} = 1$ , pa i njezin graf prolazi točkom  $(0, 1)$ .

Nadalje, graf funkcije  $f$  siječe os  $x$  u točki  $S_1(x_0, 0)$ , što znači da je  $f(x_0) = 0$ . No, to znači da  $f_1(x_0)$  ne postoji jer je  $f_1(x_0) = \frac{1}{f(x_0)} = \frac{1}{0}$ , a vrijednost toga izraza nije definirana. Zbog toga graf

funkcije  $f_1$  ima okomitu asimptotu  $x = x_0$ . Budući da je očito  $x_0 < 0$ , ta okomita asimptota nalazi se lijevo od osi ordinata.

Jedini od svih četiriju ponuđenih grafova koji ima okomitu asimptotu lijevo od osi ordinata i prolazi točkom  $(0, 1)$  je graf C. (Grafovi B i D ne prolaze točkom  $(0, 1)$ , a graf A nema niti jednu okomitu asimptotu.)

**14. B.** Odredimo najprije koji redni broj odgovara svakom pojedinom datumu. Datumu 22. veljače odgovara redni broj  $d_1 = 31 + 22 = 53$ , a datumu 2. veljače odgovara redni broj  $d_2 = 31 + 2 = 33$ . Zbog toga je temperatura zraka 22. veljače jednaka  $T(53)$ , tj.



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU  
POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE  
**ELEKTROTEHNIČKI ODJEL**

## RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNUJU 2012. – VIŠA RAZINA

$$T(53) = a \cdot \sin\left[\frac{2 \cdot \pi}{365} \cdot (53 - 123)\right] = a \cdot \sin\left[\frac{2 \cdot \pi}{365} \cdot (-70)\right] = a \cdot \sin\left(-\frac{28}{73} \cdot \pi\right) = -a \cdot \sin\left(\frac{28}{73} \cdot \pi\right).$$

Ovdje smo primijenili činjenicu da je funkcija sinus neparna funkcija, tj. da vrijedi identitet:

$$\sin(-x) = -\sin x, \text{ za svaki } x \in \mathbf{R}.$$

Analogno, temperatura zraka 2. veljače jednaka je  $T(33)$ , tj.

$$T(33) = a \cdot \sin\left[\frac{2 \cdot \pi}{365} \cdot (33 - 123)\right] = a \cdot \sin\left[\frac{2 \cdot \pi}{365} \cdot (-90)\right] = a \cdot \sin\left(-\frac{36}{73} \cdot \pi\right) = -a \cdot \sin\left(\frac{36}{73} \cdot \pi\right).$$

Prema uvjetu zadatka mora vrijediti jednakost

$$T(53) - T(33) = 1.3,$$

pa uvrštavanjem gornjih jednakosti dobivamo jednadžbu:

$$-a \cdot \sin\left(\frac{28}{73} \cdot \pi\right) - \left[-a \cdot \sin\left(\frac{36}{73} \cdot \pi\right)\right] = 1.3,$$

odnosno

$$a \cdot \left[ \sin\left(\frac{36}{73} \cdot \pi\right) - \sin\left(\frac{28}{73} \cdot \pi\right) \right] = 1.3,$$

a odatle je

$$a = \frac{1.3}{\sin\left(\frac{36}{73} \cdot \pi\right) - \sin\left(\frac{28}{73} \cdot \pi\right)} \approx \frac{1.3}{0.9997685 - 0.9338372} \approx 19.7175 \approx 19.7.$$

- 15. B.** Primijetimo najprije da je broj  $n!$  djeljiv s brojem  $k!$  ako i samo ako vrijedi nejednakost  $n \geq k$ . Ta tvrdnja slijedi izravno iz identiteta

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot k \cdot (k+1) \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = k! \cdot (k+1) \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n.$$

Znamo da je  $5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$  i taj je broj djeljiv s 30. Prema iskazanoj tvrdnji, brojevi  $6!, 7!, 8!, \dots, 13!, 14!$  i  $15!$  djeljivi su s  $5! = 120$ , pa je posebno svaki od njih djeljiv i s 30. Zbog toga je traženi ostatak jednak ostatku koji daje zbroj  $1! + 2! + 3! + 4!$  pri dijeljenju s 30. Budući da je

$$1! + 2! + 3! + 4! = 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 1 + 2 + 6 + 24 = 33,$$

zapravo tražimo ostatak pri dijeljenju broja 33 s 30. Taj je ostatak očito jednak 3.

Primijetimo da isti zaključak vrijedi i za zbroj  $1! + 2! + 3! + \dots + n!$ , gdje je  $n \in \mathbf{N}, n \geq 5$ .



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU  
POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE  
**ELEKTROTEHNIČKI ODJEL**

## RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNUJU 2012. – VIŠA RAZINA

### II. ZADATCI KRATKIH ODGOVORA

- 16.**  $\frac{b-a}{d} + 1$ . Imamo redom:

$$\begin{aligned} b - a &= (n - 1) \cdot d \quad /:d \\ \frac{b-a}{d} &= n - 1, \\ n &= \frac{b-a}{d} + 1. \end{aligned}$$

- 17.  $160^\circ$  i  $55^\circ$ .** Prisjetimo se činjenice da je u *svakom* trapezu zbroj dvaju susjednih kutova jednak  $180^\circ$ . Zbroj mjera dvaju zadanih kutova jednak je  $20^\circ + 125^\circ = 145^\circ \neq 180^\circ$ , pa zaključujemo da zadani kutovi nisu susjedni, nego nasuprotni. Zbog toga su mjere preostalih dvaju kutova jednake

$$180^\circ - 20^\circ = 160^\circ \text{ i } 180^\circ - 55^\circ = 125^\circ.$$

- 18. 1.) –1.** Zadanu jednadžbu transformirajmo na sljedeći način:

$$\begin{aligned} 10 \cdot x^2 - 10 &= 21 \cdot x, \\ 10 \cdot x^2 - 21 \cdot x - 10 &= 0, \quad /:10 \\ x^2 - \frac{21}{10} \cdot x - 1 &= 0. \end{aligned}$$

Tako smo dobili normiranu kvadratnu jednadžbu (onu u kojoj je koeficijent uz  $x^2$  jednak 1). Prema Vièteovim formulama, umnožak obaju rješenja te jednadžbe jednak je slobodnom članu u toj jednadžbi, tj.  $-1$ .

- 2.)**  $S = \mathbf{R} \setminus \left\langle \frac{4}{3}, \frac{3}{2} \right\rangle = \left( -\infty, \frac{4}{3} \right] \cup \left[ \frac{3}{2}, +\infty \right)$ . Zadanu nejednadžbu možemo zapisati u obliku:

$$6 \cdot x^2 - 17 \cdot x + 12 \geq 0.$$

Na lijevoj strani te nejednadžbe je polinom 2. stupnja (kvadratna funkcija). Njezin vodeći koeficijent je  $6 > 0$ , pa njezin graf ima oblik  $\cup$ . Zbog toga je vrijednost te funkcije nenegativna na intervalu koji se dobije kad se iz skupa  $\mathbf{R}$  „izbací“ otvoreni interval određen realnim nultočkama te funkcije. Riješimo li kvadratnu jednadžbu

$$6 \cdot x^2 - 17 \cdot x + 12 = 0,$$

dobit ćemo:

$$x_{1,2} = \frac{17 \pm \sqrt{17^2 - 4 \cdot 6 \cdot 12}}{2 \cdot 6} = \frac{17 \pm \sqrt{289 - 288}}{12} = \frac{17 \pm 1}{12} \Rightarrow x_1 = \frac{17 - 1}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}, \quad x_2 = \frac{17 + 1}{12} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}.$$



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU  
POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE  
**ELEKTROTEHNIČKI ODJEL**

## RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNUJU 2012. – VIŠA RAZINA

Dakle, skup svih rješenja polazne nejednadžbe je  $S = \mathbf{R} \setminus \left\langle \frac{4}{3}, \frac{3}{2} \right\rangle$ . Taj skup možemo zapisati i kao uniju dvaju disjunktnih poluzatvorenih intervala, tj. kao  $S = \left\langle -\infty, \frac{4}{3} \right] \cup \left[ \frac{3}{2}, +\infty \right\rangle$ .

**19. 1.)**  $\frac{9}{k+1}$  za  $k \neq -1$ . Iz druge jednadžbe sustava slijedi:

$$\begin{aligned}\frac{x}{y} &= k, \\ x &= k \cdot y\end{aligned}$$

Uvrštavanjem te jednakosti u prvu jednadžbu sustava dobijemo:

$$\begin{aligned}\sqrt{k \cdot y + y} &= 3 \quad /^2 \\ k \cdot y + y &= 3^2, \\ y \cdot (k+1) &= 9, \\ y &= \frac{9}{k+1}.\end{aligned}$$

Odmah primijetimo da izraz za  $y$  nije definiran ako je  $k = -1$  jer uvrštenjem te vrijednosti u polazni sustav dobivamo nemoguću jednakost  $0 = 3$ . Zbog toga je izraz za  $y$  definiran uz dodatnu pretpostavku  $k \neq -1$ .

**2.) 57.** Neka su  $x$  polazni broj,  $d$  njegova znamenka desetica, a  $j$  njegova znamenka jedinica. Tada vrijedi jednakost:

$$x = 10 \cdot d + j.$$

Zamijenimo li znamenke, tj. postane li  $j$  znamenka desetica, a  $d$  znamenka jedinica, dobit ćemo broj

$$y = 10 \cdot j + d.$$

Prema uvjetu zadatka moraju vrijediti jednakosti:

$$\begin{aligned}d + j &= 12, \\ y - x &= 18.\end{aligned}$$

Uvrštavanjem izraza  $x = 10 \cdot d + j$  i  $y = 10 \cdot j + d$  u drugu od gornjih dviju jednakosti dobijemo:

$$\begin{aligned}10 \cdot j + d - (10 \cdot d + j) &= 18, \\ 10 \cdot j + d - 10 \cdot d - j &= 18, \\ 9 \cdot j - 9 \cdot d &= 18,\end{aligned}$$



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE

## ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

### RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNUJU 2012. – VIŠA RAZINA

$$\begin{aligned} 9 \cdot (j - d) &= 18, \quad /:9 \\ j - d &= 2. \end{aligned}$$

Tako smo dobili sustav dviju linearnih jednadžbi s dvije nepoznanice:

$$\begin{cases} d + j = 12 \\ j - d = 2 \end{cases}$$

Zbrajanjem tih dviju jednadžbi dobivamo  $j = 7$ , a oduzimanjem  $d = 5$ . Zbog toga je polazni broj

$$x = 10 \cdot d + j = 10 \cdot 5 + 7 = 57.$$

**20. 1.)**  $(a^2 - 1) + a \cdot i$ . Koristeći jednakost  $i^2 = -1$  i formulu za kvadrat zbroja imamo redom:

$$z = a^2 + 2 \cdot a \cdot i + i^2 + \frac{a \cdot i}{i \cdot i} = a^2 + 2 \cdot a \cdot i + (-1) + \frac{a \cdot i}{-1} = (a^2 - 1) + 2 \cdot a \cdot i - a \cdot i = (a^2 - 1) + a \cdot i .$$

**2.) 2.** Zadani je broj već zapisan u trigonometrijskom obliku, tj. u obliku  $z = r \cdot \text{cis } \varphi = r \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$ , gdje je  $r$  apsolutna vrijednost broja  $z$ , a  $\varphi$  njegov argument. Naime,

$$z = 2 \cdot \cos\left(\frac{2}{7} \cdot \pi\right) + 2 \cdot i \cdot \sin\left(\frac{2}{7} \cdot \pi\right) = 2 \cdot \left[ \cos\left(\frac{2}{7} \cdot \pi\right) + i \cdot \sin\left(\frac{2}{7} \cdot \pi\right) \right] ,$$

pa lagano očitamo  $r = 2$  i  $\varphi = \frac{2}{7} \cdot \pi$ . Dakle, apsolutna vrijednost zadanoga broja jednaka je  $r = 2$ .

**21. 1.) 37.89.** Primijenimo sinusov poučak u obliku:

$$\frac{|\overline{MK}|}{\sin \angle KNM} = \frac{|\overline{KN}|}{\sin \angle KMN}$$

Odavde izravno slijedi:

$$|\overline{KN}| = \frac{\sin \angle KMN}{\sin \angle KNM} \cdot |\overline{MK}| = \frac{\sin 42^\circ}{\sin 62^\circ} \cdot 50 = \frac{0.66913061}{0.88294759} \cdot 50 \approx 37.891864 \approx 37.89 \text{ cm.}$$

**2.).**  $5 \cdot \sqrt{22} \approx 23.45$ . Neka je  $S$  nožište težišnice povučene iz vrha  $A$ . Produljimo uočenu težišnicu preko vrha  $S$  za njezinu duljinu i na taj način konstruirajmo točku  $D$ . Četverokut  $ABDC$  je usporednik (paralelogram) jer mu se dijagonale  $AD$  i  $BC$  raspolažaju u točki  $S$ . Naime, prema konstrukciji točke  $D$ , točka  $S$  je polovište dužine  $\overline{AD}$ , dok je  $S$  polovište dužine  $\overline{BC}$  prema definiciji težišnice povučene iz vrha  $A$  na stranicu  $a = \overline{BC}$ .

Uočimo da je kut pri vrhu  $A$  četverokuta  $ABDC$  jednak kutu  $\alpha$  trokuta  $ABC$ . To znači da je kut pri vrhu  $B$  četverokuta  $ABCD$  jednak



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU  
POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE  
**ELEKTROTEHNIČKI ODJEL**

## RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNUJU 2012. – VIŠA RAZINA

$$\beta' = 180^\circ - \alpha$$

jer je zbroj dvaju susjednih kutova u svakom usporedniku jednak  $180^\circ$ . Primijenimo li kosinusov poučak na trokutove  $ABC$  i  $ABD$ , dobit ćemo:

$$a^2 = |\overline{BC}|^2 = |\overline{AB}|^2 + |\overline{AC}|^2 - 2 \cdot |\overline{AB}| \cdot |\overline{AC}| \cdot \cos \angle CAB = c^2 + b^2 - 2 \cdot c \cdot b \cdot \cos \alpha,$$
$$(2 \cdot t_a)^2 = |\overline{AD}|^2 = |\overline{AB}|^2 + |\overline{BD}|^2 - 2 \cdot |\overline{AB}| \cdot |\overline{BD}| \cdot \cos \angle ABD = c^2 + b^2 - 2 \cdot c \cdot b \cdot \cos \beta'.$$

Budući da za svaki  $x \in \mathbf{R}$  vrijedi identitet

$$\cos(180^\circ - x) = -\cos x,$$

to je

$$\cos \beta' = \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha.$$

Uvrštenjem toga identiteta u drugu od gornjih jednakosti dobivamo jednadžbe:

$$a^2 = c^2 + b^2 - 2 \cdot c \cdot b \cdot \cos \alpha,$$
$$(2 \cdot t_a)^2 = c^2 + b^2 + 2 \cdot c \cdot b \cdot \cos \alpha.$$

Njihovim zbrajanjem dobijemo:

$$a^2 + 4 \cdot t_a^2 = 2 \cdot (c^2 + b^2) \quad / : 2$$
$$\frac{a^2 + 4 \cdot t_a^2}{2} = c^2 + b^2,$$
$$c^2 = \frac{a^2}{2} + \frac{4 \cdot t_a^2}{2},$$
$$c^2 = \frac{1}{2} \cdot a^2 + 2 \cdot t_a^2 - b^2$$

Preostaje uvrstiti zadane podatke  $a = 20$ ,  $b = 30$ ,  $t_a = 25$ , pa konačno imamo:

$$c^2 = \frac{1}{2} \cdot 20^2 + 2 \cdot 25^2 - 30^2 = \frac{1}{2} \cdot 400 + 2 \cdot 625 - 900 = 200 + 1250 - 900 = 550,$$
$$c = \sqrt{550} = \sqrt{25 \cdot 22} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{22} = 5 \cdot \sqrt{22} \approx 23.4520788 \text{ cm}$$

- 22. 1.)**  $-\frac{2}{3}$ . Članove jednadžbe zapisat ćemo kao potencije s bazom 2 koristeći jednakosti  $4 = 2^2$  i  $8 = 2^3$ . Pri sređivanju izraza primjenit ćemo pravilo da se potencija potencira tako da se njezina baza prepiše, a eksponenti pomnože. Imamo redom:



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU  
POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE  
ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

## RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNUJU 2012. – VIŠA RAZINA

$$\begin{aligned}(2^2)^{3x-2} &= \left(\frac{1}{2^3}\right)^{2-x}, \\ 2^{2(3x-2)} &= \left[(2^3)^{-1}\right]^{2-x}, \\ 2^{6x-4} &= 2^{-6+3x}\end{aligned}$$

Izjednačavanjem eksponenata dobijemo:

$$\begin{aligned}6 \cdot x - 4 &= -6 + 3 \cdot x, \\ 6 \cdot x - 3 \cdot x &= -6 + 4, \\ 3 \cdot x &= -2.\end{aligned}$$

Dijeljenjem s 3 dobijemo  $x = -\frac{2}{3}$ .

**2.)**  $x < 4$  ili  $x \in (-\infty, 4)$ . Imamo redom:

$$\begin{aligned}6^x &< 16 \cdot 3^x \quad / : 3^x \\ \frac{6^x}{3^x} &< 16 \\ \left(\frac{6}{3}\right)^x &< 16, \\ 2^x &< 2^4\end{aligned}$$

Budući da je eksponencijalna funkcija  $f(x) = 2^x$  strogo rastuća (jer joj je baza strogo veća od 1), prigodom usporedbe eksponenata znak nejednakosti ostaje nepromijenjen. Tako se odmah dobije  $x < 4$  ili, ekvivalentno,  $x \in (-\infty, 4)$ .

**23. 1.) 961.** Traženi broj jednak je prirodnom broju koji je najbliži vrijednosti  $B(21)$ . Budući da je

$$B(21) = 300 \cdot 1.057^{21} \approx 960.94,$$

traženi broj bakterija jednak je 961.

**2.) 74.0804%.** Traženi postotak jednak je vrijednosti  $\frac{B(t+10) - B(t)}{B(t)} \cdot 100 = \left[ \frac{B(t+10)}{B(t)} - 1 \right] \cdot 100$ .

Budući da je  $B(t+10) = 300 \cdot 1.057^{t+10}$ , uvrštavanjem redom dobivamo:

$$\begin{aligned}p &= \left( \frac{300 \cdot 1.057^{t+10}}{300 \cdot 1.057^t} - 1 \right) \cdot 100 \\ p &= (1.057^{10} - 1) \cdot 100 \\ p &\approx 74.0804 \%\end{aligned}$$



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE

## ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

### RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNUJU 2012. – VIŠA RAZINA

**24. 1.) 0.4636.** Primijenit ćemo identitet:

$$\sin(2 \cdot x) = 2 \cdot \sin x \cdot \cos x,$$

te činjenicu da za svaki  $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  vrijedi nejednakost  $\cos x > 0$ . Imamo redom:


$$\begin{aligned} \cos^2 x &= \sin(2 \cdot x), \\ \cos^2 x &= 2 \cdot \sin x \cdot \cos x \quad / : \cos^2 x > 0, \\ 1 &= 2 \cdot \frac{\sin x \cdot \cos x}{\cos^2 x} \\ 1 &= 2 \cdot \frac{\sin x}{\cos x}, \\ 1 &= 2 \cdot \tan x \quad / : 2 \\ \tan x &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Otuda slijedi  $x = \arctan \frac{1}{2} \approx 0.463647609 \approx 0.4636$  radijana.

**2.) Vidjeti sliku 1.** Zadanu funkciju možemo nacrtati izravno ili koristeći transformaciju:

$$f(x) = 4 \cdot \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = 4 \cdot \left(\cos x \cdot \cos \frac{\pi}{2} - \sin x \cdot \sin \frac{\pi}{2}\right) = 4 \cdot (-\sin x) = -4 \cdot \sin x.$$

Ovako transformiranu funkciju je lako nacrtati. Osnovnu sinusoidu (graf funkcije  $g(x) = \sin x$ ) „izdužimo“ 4 puta, pa konstruiramo osno simetričnu sliku tako dobivene krivulje s obzirom na os  $x$ . Dobijemo krivulju kao na slici 1.



Slika 1.



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU  
POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE  
ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

## RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNUJU 2012. – VIŠA RAZINA

- 25. 1.)**  $-\pi \cdot \sin x$ . Zadanu funkciju deriviramo tako da konstantu  $\pi$  prepisemo, a izraz  $\cos x$  deriviramo. Derivacija funkcije  $g(x) = \cos x$  je  $g'(x) = -\sin x$ , pa je

$$f'(x) = \pi \cdot (-\sin x) = -\pi \cdot \cos x.$$

- 2.) 9.** Odredimo najprije  $g'(x)$ . Uočimo da je  $g(x) = (2 \cdot x - 3)^{\frac{3}{2}}$ , pa primjenom osnovnih pravila za deriviranje i tablice derivacija elementarnih funkcija dobivamo redom:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{3}{2} \cdot (2 \cdot x - 3)^{\frac{3}{2}-1} \cdot (2 \cdot x - 3)' \\ g'(x) &= \frac{3}{2} \cdot (2 \cdot x - 3)^{\frac{1}{2}} \cdot [(2 \cdot x)' - 3]' \\ g'(x) &= \frac{3}{2} \cdot (2 \cdot x - 3)^{\frac{1}{2}} \cdot (2 - 0), \\ g'(x) &= \frac{3}{2} \cdot (2 \cdot x - 3)^{\frac{1}{2}} \cdot 2, \\ g'(x) &= 3 \cdot (2 \cdot x - 3)^{\frac{1}{2}}, \\ g'(x) &= 3 \cdot \sqrt{2 \cdot x - 3} \end{aligned}$$

Zbog toga je

$$g'(6) = 3 \cdot \sqrt{2 \cdot 6 - 3} = 3 \cdot \sqrt{12 - 3} = 3 \cdot \sqrt{9} = 3 \cdot 3 = 9 .$$

- 3.) –5.** Odredimo najprije prve dvije derivacije funkcije  $h$ . Primjenom osnovnih pravila za deriviranje i tablice derivacija elementarnih funkcija dobivamo redom:

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{2}{3} \cdot 3 \cdot x^{3-1} + \frac{9}{2} \cdot 2 \cdot x^{2-1} - 5 - 0 = 2 \cdot x^2 + 9 \cdot x - 5, \\ h''(x) &= 2 \cdot 2 \cdot x^{2-1} + 9 - 0 = 4 \cdot x + 9 \end{aligned}$$

Uočimo da je  $h''(x) < 0$  ako i samo ako je

$$4 \cdot x + 9 < 0 ,$$

odnosno

$$4 \cdot x < -9 ,$$

odnosno

$$x < -\frac{9}{4} .$$



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU  
POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE  
ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

## RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNUJU 2012. – VIŠA RAZINA

Zbog toga tražimo onu stacionarnu točku zadane funkcije čija je prva koordinata strogo manja od  $-\frac{9}{4}$ .

Riješimo li jednadžbu  $h'(x) = 0$ , tj. kvadratnu jednadžbu

$$2 \cdot x^2 + 9 \cdot x - 5 = 0,$$

dobit ćemo:

$$\begin{aligned} x_{1,2} &= \frac{-9 \pm \sqrt{9^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-5)}}{2 \cdot 2} = \frac{-9 \pm \sqrt{81 + 40}}{4} = \frac{-9 \pm \sqrt{121}}{4} = \frac{-9 \pm 11}{4} \Rightarrow \\ x_1 &= \frac{-9 + 11}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{-9 - 11}{4} = -\frac{20}{4} = -5 \end{aligned}$$

Vrijednost  $x_1$  je očito strogo veća od  $-\frac{9}{4}$ , pa je jedino moguće  $x = -5$ . Dakle, za  $x = -5$  zadana

funkcija postiže lokalni maksimum  $h(-5) = \frac{2}{3} \cdot (-5)^3 + \frac{9}{2} \cdot (-5)^2 - 5 \cdot (-5) - \frac{5}{6} = \frac{160}{3}$ .

- 26. (-1,-4). Vidjeti sliku 2.** Iz propisa zadane funkcije očitamo  $a = 1$ ,  $b = 2$ ,  $c = -3$ , pa uvrstimo te podatke u formulu za izračunavanje tjemena grafa kvadratne funkcije:

$$T\left(-\frac{b}{2 \cdot a}, \frac{4 \cdot a \cdot c - b^2}{4 \cdot a}\right) = \left(-\frac{2}{2 \cdot 1}, \frac{4 \cdot 1 \cdot (-3) - 2^2}{4 \cdot 1}\right) = \left(-\frac{2}{2}, \frac{-12 - 4}{4}\right) = \left(-1, -\frac{16}{4}\right) = (-1, -4).$$

Budući da je vodeći koeficijent  $a = 1$  strogo veći od nule, graf zadane funkcije je parabola oblika  $\cup$ . Za njezino jednoznačno definiranje (jer je svaki graf polinoma 2. stupnja jednoznačno određen zadavanjem bilo kojih triju različitih točaka toga grafa) odredimo još realne nultočke zadane funkcije:

$$\begin{aligned} x^2 + 2 \cdot x - 3 &= 0 \\ x_{1,2} &= \frac{-2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3)}}{2 \cdot 1} = x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 12}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{16}}{2} = \frac{-2 \pm 4}{2} \Rightarrow \\ x_1 &= \frac{-2 - 4}{2} = \frac{-6}{2} = -3, \quad x_2 = \frac{-2 + 4}{2} = \frac{2}{2} = 1 \end{aligned}$$

Zbog toga traženi graf prolazi točkama  $T(-1, -4)$ ,  $S_1(-3, 0)$  i  $S_2(1, 0)$ . On je prikazan na slici 2.




TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

## RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNUJU 2012. – VIŠA RAZINA



Slika 2.

- 27. 1.)**  $D_f = [-2, 1]$ . Svaki od drugih korijena koji se pojavljuje u propisu funkcije  $f$  definiran je za nenegativni radikand. Drugim riječima, svaki od izraza pod drugim korijenom mora biti nenegativan. Tako dobivamo sustav dviju linearnih nejednadžbi s jednom nepoznanicom:

$$\begin{cases} 1-x \geq 0 \\ x+2 \geq 0 \end{cases}$$

Iz prve nejednadžbe je  $x \leq 1$ , a iz druge  $x \geq -2$ . Svi realni brojevi koji istodobno nisu veći od 1 i nisu manji od  $-2$  tvore segment  $[-2, 1]$ . Zbog toga je taj tražena domena zadane funkcije.

- 2.)**  $x = -\frac{1}{2}$ . Za  $x \in D_f = [-2, 1]$  svaki od korijena iz propisa funkcije  $f$  je dobro definiran nenegativan realan broj. Zbog toga imamo redom:

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 \\ \sqrt{1-x} - \sqrt{x+2} &= 0 \\ \sqrt{1-x} &= \sqrt{x+2} \quad /^2 \\ 1-x &= x+2 \\ -x-x &= 2-1 \\ (-2) \cdot x &= 1 \quad /:(-2) \\ x &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Očito je  $x = -\frac{1}{2} \in D_f$  i to je jedino rješenje polazne jednadžbe.



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE

## ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

### RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNUJU 2012. – VIŠA RAZINA

**28. 1.)**  $\frac{729}{4} = 182.25$ . Podsjetimo se osnovnoga svojstva geometrijskoga niza  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  čiji je prvi član

$a_1$ , a količnik  $q$  (pri čemu su  $g_1, q \neq 0$ ). Za svaki prirodan broj  $n$  vrijedi jednakost

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = q.$$

Posebno, za  $n = 3$  vrijedi:

$$\frac{a_4}{a_3} = q.$$

Iz jednakosti  $a_4 = \frac{3}{2} \cdot a_3$  zadane u zadatku dijeljenjem s  $a_3$  dobijemo:

$$\frac{a_4}{a_3} = \frac{3}{2}.$$

(Pritom koristimo očitu činjenicu da iz podatka  $a_1 = 16$  i pretpostavke  $q \neq 0$  slijedi da su svi članovi geometrijskoga niza različiti od nule, pa smijemo množiti i dijeliti jednakosti tim brojevima.) Uspoređivanjem jednakosti

$$\begin{aligned}\frac{a_4}{a_3} &= q \\ \frac{a_4}{a_3} &= \frac{3}{2}\end{aligned}$$

slijedi  $q = \frac{3}{2}$ . (Lijeve strane tih jednakosti su jednake, pa takve moraju biti i desne strane.) Tako odmah imamo:

$$a_7 = a_1 \cdot q^{7-1} = 16 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^6 = 2^4 \cdot \frac{3^6}{2^6} = \frac{3^6}{2^2} = \frac{729}{4} = 182.25.$$

**2.) 476.** Formulu za opći član zadatog niza transformirajmo na sljedeći način:

$$\begin{aligned}a_n &= 24.2 - 0.6 \cdot n = 24.2 - 0.6 \cdot n + 0.6 - 0.6 = (24.2 - 0.6) + (-0.6 \cdot n - 1) = 23.6 + (-0.6) \cdot (n - 1) = 23.6 + (n - 1) \cdot (-0.6).\end{aligned}$$

Odatle zaključujemo da je  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  aritmetički niz čiji je prvi član  $a_1 = 23.6$ , a razlika  $d = -0.6$ . Budući da je  $d < 0$ , riječ je o strogo padajućem aritmetičkom nizu. Odredimo koliko je ukupno njegovih članova strogo pozitivno. U tu svrhu u skupu prirodnih brojeva  $\mathbb{N}$  riješimo nejednadžbu

$$a_n > 0.$$



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU  
POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE  
**ELEKTROTEHNIČKI ODJEL**

## RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNUJU 2012. – VIŠA RAZINA

Imamo redom:

$$\begin{aligned} 24.2 - 0.6 \cdot n &> 0, \\ -0.6 \cdot n &> -24.2 \quad /:(-0.6), \\ n < \frac{24.2}{0.6} = \frac{242}{6} = \frac{121}{3} &= 40\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Najveći prirodan broj koji zadovoljava posljednju nejednakost je  $n = 40$ . Zbog toga je svaki od prvih 40 članova zadatog niza strogo pozitivan realan broj. Mi tražimo zbroj svih tih 40 članova. Taj ćemo zbroj izračunati prema formuli za zbroj prvih  $n$  članova aritmetičkoga niza:

$$S_n = \frac{n}{2} \cdot [2 \cdot a_1 + (n-1) \cdot d].$$

Uvrstimo  $n = 40$ ,  $a_1 = 23.6$  i  $d = -0.6$ , pa dobijemo:

$$S_{40} = \frac{40}{2} \cdot [2 \cdot 23.6 + (40-1) \cdot (-0.6)] = 20 \cdot (47.2 - 39 \cdot 0.6) = 20 \cdot (47.2 - 23.4) = 20 \cdot 23.8 = 476.$$

**3.) 20.** Koristimo osnovnu formulu složenoga kamatnoga računa (dekurzivan obračun kamata): Ako se glavnica  $C$  uloži na  $n$  godina uz godišnju kamatnu stopu  $p\%$ , onda je njezina vrijednost na kraju  $n$ -te godine

$$C_n = C_0 \cdot (1 + p\%)^n,$$

dok je iznos ukupnih pripisanih kamata

$$K = C_n - C_0 = C_0 \cdot \left[ (1 + p\%)^n - 1 \right].$$

U našem zadatku je  $C_0 = 5000$ ,  $p = 1.7$  i  $K = 2000$ . Tako dobivamo eksponencijalnu jednadžbu:

$$2000 = 5000 \cdot [(1 + 1.7\%)^n - 1].$$

Nju rješavamo na uobičajen način:

$$\begin{aligned} 2000 &= 5000 \cdot \left[ (1 + 1.7\%)^n - 1 \right] \\ \left(1 + \frac{1.7}{100}\right)^n - 1 &= \frac{2000}{5000} \\ (1 + 0.017)^n &= \frac{2}{5} + 1 \\ 1.017^n &= 0.4 + 1 \\ 1.017^n &= 1.4 \\ n = \log_{1.017} 1.4 &= \frac{\log 1.4}{\log 1.017} = \frac{0.146128}{0.007321} \approx 19.96 \approx 20 \end{aligned}$$



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU  
POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE  
**ELEKTROTEHNIČKI ODJEL**

## **RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNUJU 2012. – VIŠA RAZINA**

### **III. ZADATCI PRODUŽENIH ODGOVORA**

- 29. 1.)**  $\left(\frac{2}{3}, 0\right)$ . Možemo pretpostaviti da je jednadžba hiperbole  $b^2 \cdot x^2 - a^2 \cdot y^2 = a^2 \cdot b^2$ , gdje su  $a, b > 0$  realne konstante. Hiperbola očito prolazi točkom  $T = (2, 0)$ , pa uvrštavanjem koordinata te točke u jednadžbu hiperbole dobivamo:

$$\begin{aligned} b^2 \cdot 2^2 - a^2 \cdot 0^2 &= a^2 \cdot b^2, \\ b^2 \cdot 4 - a^2 \cdot 0 &= a^2 \cdot b^2, \\ b^2 \cdot 4 &= a^2 \cdot b^2 \quad /:b^2 \\ a^2 &= 4. \end{aligned}$$

Nadalje, hiperbola prolazi točkom  $A = (6, 2)$ , pa uvrštavanjem koordinata te točke i  $a^2 = 4$  u jednadžbu hiperbole dobivamo:

$$\begin{aligned} b^2 \cdot 6^2 - 4 \cdot 2^2 &= 4 \cdot b^2, \\ b^2 \cdot 36 - 4 \cdot 4 &= 4 \cdot b^2, \\ 36 \cdot b^2 - 4 \cdot b^2 &= 16, \\ 32 \cdot b^2 &= 16, \quad /:32 \\ b^2 &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Dakle, jednadžba hiperbole glasi:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cdot x^2 - 4 \cdot y^2 &= \frac{1}{2} \cdot 4, \\ \frac{1}{2} \cdot x^2 - 4 \cdot y^2 &= 2. \end{aligned}$$

Jednadžba tangente na graf funkcije  $f$  u točki  $T(x_T, y_T)$  dana je izrazom

$$t \dots y - y_T = f'(x_T) \cdot (x - x_T).$$

Apiscisu njezina sjecišta  $S$  s osi  $x$  dobijemo uvrstimo li u gornju jednadžbu  $y = 0$ :

$$\begin{aligned} 0 - y_T &= f'(x_T) \cdot (x - x_T) \quad /: f'(x_T) \\ -\frac{y_T}{f'(x_T)} &= x - x_T \\ x &= x_T - \frac{y_T}{f'(x_T)} \end{aligned}$$

pa je  $S\left(x_T - \frac{y_T}{f'(x_T)}, 0\right)$ . Zbog toga nam preostaje odrediti prvu derivaciju funkcije čiji je graf zadana hiperbola. Tu funkciju možemo zadati propisom ako iz jednadžbe hiperbole izrazimo  $y$  po-



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU  
POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE  
**ELEKTROTEHNIČKI ODJEL**

## **RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNUJU 2012. – VIŠA RAZINA**

moću varijable  $x$ , ali brže i bolje je postupiti ovako:

Shvaćajući varijablu  $y$  kao funkciju varijable  $x$ , deriviramo izraz koji zadaje hiperbolu:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2} \cdot x^2\right)' - (4 \cdot y^2)' &= 2', \\ \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot x^{2-1} - 4 \cdot 2 \cdot y^{2-1} \cdot y' &= 0 \\ x - 8 \cdot y \cdot y' &= 0 \\ 8 \cdot y \cdot y' &= x \\ y' &= \frac{x}{8 \cdot y} \end{aligned}$$

Zbog toga tangenta na zadanu hiperbolu povučena u bilo kojoj točki  $T$  siječe os  $x$  u točki

$$S\left(x_T - \frac{y_T}{f'(x_T)}, 0\right) = \left(x_T - \frac{y_T}{\frac{x_T}{8 \cdot y_T}}, 0\right) = \left(x_T - \frac{8 \cdot y_T^2}{x_T}, 0\right) = \left(\frac{x_T^2 - 8 \cdot y_T^2}{x_T}, 0\right)$$

Primijenimo dobivene rezultate na točku  $A(6, 2)$ . Traženo sjecište tangente u točki  $A$  dobijemo tako da u gornji izraz uvrstimo  $x_T = 6$ ,  $y_T = 2$ . Tako je konačno:

$$S\left(\frac{6^2 - 8 \cdot 2^2}{6}, 0\right) = \left(\frac{36 - 8 \cdot 4}{6}, 0\right) = \left(\frac{36 - 32}{6}, 0\right) = \left(\frac{4}{6}, 0\right) = \left(\frac{2}{3}, 0\right)$$

**2.)**  $2 \cdot \vec{i} - 5 \cdot \vec{j}$ . Imamo redom:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP} &= (x_N - x_M) \cdot \vec{i} + (y_N - y_M) \cdot \vec{j} + (x_P - x_M) \cdot \vec{i} + (y_P - y_M) \cdot \vec{j} \\ \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP} &= [(x_N - x_M) + (x_P - x_M)] \cdot \vec{i} + [(y_N - y_M) + (y_P - y_M)] \cdot \vec{j}, \\ \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP} &= (x_N + x_P - 2 \cdot x_M) \cdot \vec{i} + (y_N + y_P - 2 \cdot y_M) \cdot \vec{j}, \\ \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP} &= (-1 + 7 - 2 \cdot 2) \cdot \vec{i} + (4 - 3 - 2 \cdot 3) \cdot \vec{j} = (-1 + 7 - 4) \cdot \vec{i} + (4 - 3 - 6) \cdot \vec{j} = 2 \cdot \vec{i} - 5 \cdot \vec{j} \end{aligned}$$

**3.)**  $(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 9$  ili  $x^2 + y^2 - 4 \cdot x - 8 \cdot y + 11 = 0$ . **Vidjeti Sliku 3.** Skup svih točaka koje su od zadane točke  $S$  udaljene za  $r > 0$  je, po definiciji, kružnica sa središtem u točki  $S$  i polumjerom  $r$ . U ovom je slučaju rješenje zadatka kružnica sa središtem u točki  $S(2, 4)$  i polumjerom  $r = 3$ . Jednadžba te kružnice je:

$$(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 9,$$

ili, nakon kvadriranja, u razvijenom obliku:

$$x^2 - 2 \cdot x \cdot 2 + 2^2 + y^2 - 2 \cdot y \cdot 4 + 4^2 = 9,$$



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU


POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE

### ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

## RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNUJU 2012. – VIŠA RAZINA

$$\begin{aligned}x^2 - 4 \cdot x + 4 + y^2 - 8 \cdot y + 16 - 9 &= 0, \\x^2 + y^2 - 4 \cdot x - 8 \cdot y + 11 &= 0.\end{aligned}$$

Dobivena kružnica prikazana je na slici 3.



Slika 3.

4.)  $\frac{85}{8} = 10.625$  jed. Uočimo da je zadana krivulja parabola oblika  $y^2 = 2 \cdot p \cdot x$ . Naime, dijeljenjem jednadžbe zadane krivulje s 2 dobivamo

$$y^2 = \frac{5}{2} \cdot x,$$

pa je riječ o paraboli za koju je  $2 \cdot p = \frac{5}{2}$ . Zbog toga je žarište zadane parabole

$$F\left(\frac{p}{2}, 0\right) = \left(\frac{2 \cdot p}{4}, 0\right) = \left(\frac{5}{4}, 0\right) = \left(\frac{5}{8}, 0\right).$$

Odredimo nepoznatu koordinatu točke  $T$ . U propis kojim je definirana parabola uvrstimo  $x = 10$ , pa dobijemo:

$$\begin{aligned}y^2 &= \frac{5}{2} \cdot 10 \\y^2 &= 25\end{aligned}$$

Odatle vađenjem drugoga korijena (zbog pretpostavke  $y_T > 0$ ) dobijemo  $y = 5$ . Zbog toga je  $T = (10, 5)$ .

Preostaje izračunati udaljenost točaka  $F$  i  $T$ :



TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE

## ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

### RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNUJU 2012. – VIŠA RAZINA

$$|FT| = \sqrt{(x_T - x_F)^2 + (y_T - y_F)^2} = \sqrt{\left(10 - \frac{5}{8}\right)^2 + (5 - 0)^2} = \sqrt{\left(\frac{10 \cdot 8 - 5}{8}\right)^2 + 5^2} = \sqrt{\left(\frac{80 - 5}{8}\right)^2 + 5^2}$$

$$|FT| = \sqrt{\left(\frac{75}{8}\right)^2 + 25} = \sqrt{\frac{5625}{64} + 25} = \sqrt{\frac{5625 + 64 \cdot 25}{64}} = \sqrt{\frac{5625 + 1600}{64}} = \sqrt{\frac{7225}{64}} = \frac{85}{8} = 10.625$$

**4.) ≈1.678541 m.** Budući da je duljina male osi elipse strogo manja od duljine satelita, satelit nužno moramo postaviti po dužini raketne (usporedno s velikom osi). Smjestimo li raketu i satelit u pravokutni koordinatni sustav u ravnini, onda raketu možemo zamisliti kao elipsu čija je velika os  $2 \cdot a = 4.8$  m, a mala os  $2 \cdot b = 4.2$  m. Odatle slijedi  $a = 2.4$  m,  $b = 2.2$  m, pa je jednadžba elipse:

$$\frac{x^2}{2.4^2} + \frac{y^2}{2.2^2} = 1.$$

Satelit možemo zamisliti kao pravokutnik simetričan s obzirom na obje koordinatne osi (jer je takva i elipsa). Duljina pravokutnika je 4.4 m, što znači da su mu apscise svih četiriju vrhova jednake  $\pm \frac{4.4}{2} = \pm 2.2$ . Ordinate tih vrhova dobijemo tako da u jednadžbu elipse uvrstimo  $x = 2.2$  (ili  $x = -2.2$ , svejedno je). Dobivamo:

$$\begin{aligned} \frac{2.2^2}{2.4^2} + \frac{y^2}{2.2^2} &= 1 \\ \frac{y^2}{2.2^2} &= 1 - \frac{2.2^2}{2.4^2} \\ y^2 &= 2.2^2 \cdot \left(1 - \frac{2.2^2}{2.4^2}\right) = \left(\frac{21}{10}\right)^2 \cdot \left[1 - \left(\frac{11}{12}\right)^2\right] = \frac{1127}{1600} = \frac{49 \cdot 23}{1600} \\ y &= \pm \frac{7 \cdot \sqrt{23}}{40} \end{aligned}$$

Prema tome, širina pravokutnika jednaka je udaljenosti dvaju susjednih točaka s istim apscisama. Lako se vidi da je ta širina jednaka  $2 \cdot ly$ . Zbog toga je konačno:

$$b_{\max} = 2 \cdot \frac{7 \cdot \sqrt{23}}{40} = \frac{7 \cdot \sqrt{23}}{20} \approx 1.678541 \text{ m.}$$

**30.**  $a \in \mathbb{R} \setminus [-2, 2] = \langle -\infty, -2 \rangle \cup \langle 2, +\infty \rangle$ . „Kritične“ točke su  $x = -1$  i  $x = 2$ , tj. vrijedi:

$$|x+1| = \begin{cases} x+1, & \text{za } x \geq -1, \\ -(x+1), & \text{inače} \end{cases} = \begin{cases} x+1, & \text{za } x \geq -1, \\ -x-1, & \text{inače} \end{cases}, \quad |2-x| = \begin{cases} x-2, & \text{za } x \geq 2, \\ 2-x, & \text{inače.} \end{cases}$$

Zbog toga funkciju razmatramo na intervalima  $(-\infty, -1]$ ,  $(-1, 2]$  i  $(2, +\infty)$ . Dobivamo:




TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU  
POLYTECHNICUM ZAGRABIENSE  
**ELEKTROTEHNIČKI ODJEL**

## **RJEŠENJA ZADATAKA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI U LIPNJU 2012. – VIŠA RAZINA**

$$f(x) = \begin{cases} -x-1+2-x, & \text{za } x \leq -1; \\ x+1+2-x, & \text{za } x \in (-1, 2]; \\ x+1+x-2, & \text{za } x \in (2, +\infty); \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 1-2 \cdot x, & \text{za } x \leq -1; \\ 3, & \text{za } x \in (-1, 2]; \\ 2 \cdot x-1, & \text{za } x \in (2, +\infty). \end{cases}$$

Skiciramo li graf funkcije  $f$  u pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini, dobit ćemo sliku 4.



Slika 4.

Tako vidimo da će zadana jednadžba imati dva rješenja ako i samo ako vrijedi  $a^2 - 1 > 3$  jer svaki pravac  $y = a$  presijeca graf zadane funkcije u točno dvije točke ako i samo ako je  $a > 3$ . Odatle slijedi

$$a^2 - 4 > 0,$$

odnosno, analogno kao u rješenju zadatka 18.2.,

$$a \in \mathbf{R} \setminus [-2, 2] = (-\infty, -2) \cup (2, +\infty).$$

**pripremio:**  
**mr. sc. Bojan Kovačić, dipl. ing., viši predavač**